







РОБОТА З ЛУНКОЮ ПІСЛЯ ВИДАЛЕННЯ ЗУБА

Byoungkyou Park, DMD, MSD
Seoul-pil Dental Clinic | Korea



Хірургічна ділянка	Лікування	Додаткові засоби	Техніка
№16	Кісткозамінний матеріал Bontree Plus, гранули	Нейлон 5-0	Робота з лункою після видалення зуба
			
Панорамний знімок до операції	На передопераційному КТ-зображенні спостерігається значна втрата кісткової тканини в ділянці зуба №16	Після видалення зуба залишається вільний м'якотканинний трансплантат (RST)	
			
Було виконано формування лоскуту, включаючи RST	Використання кісткозамінного матеріалу Bontree Plus з подальшим закриттям RST та первинним ушиванням	Вигляд ділянки через 4 місяці після втручання, що свідчить про об'єм і якість регенованої кістки, достатньої для подальшої імплантації	
			
Встановлення імплантату	Фінальна реставрація	КТ через 8 місяців після втручання	

Тип	Вага	Об'єм	Вартість, \$
МАЛЕНЬКІ гранули			
0.30 ~ 0.50 мм	0.15 г	0.30 куб.см	29
	0.25 г	0.50 куб.см	44
	0.50 г	1.0 куб.см	74
	1.0 г	2.0 куб.см	114
СЕРЕДНІ гранули			
0.50 ~ 0.85 мм	0.15 г	0.30 куб.см	29
	0.25 г	0.50 куб.см	44
	0.50 г	1.0 куб.см	74
	1.0 г	2.0 куб.см	114
ВЕЛИКІ гранули			
1.00 ~ 1.40 мм	0.15 г	0.30 куб.см	29
	0.25 г	0.50 куб.см	44
	0.50 г	1.0 куб.см	74
	1.0 г	2.0 куб.см	114
ПАСТА шприц			
0.50 ~ 0.85 мм	0.15 г	0.30 куб.см	45
	0.25 г	0.50 куб.см	55
	0.50 г	1.0 куб.см	89